

EIN NEUER CRYPTOPHAGINE (COLEOPT.) AUS JAVA

von

Dr. K. M. HELLER,
(Dresden).

Leucohimatiops g.n. Paramecosominarum.

Corpus elongatum, subtiliter pilosum. Frons convexiuscula, impressionibus nullis, a clipeo, fere semicirculari, divisa. Antennae ante oculos insertae, clava triarticulata. Oculi rude granulati, nudi, margine postico, aspectu deorsum, lateraliter subspinoso-producto. Prothorax apice truncato, angulis anticis lobulo, subexcavato, producto, margine laterali crenulato. Scutellum transversum. Elytra striato-punctata, stria suturali solum in parte apicali explicata, lateribus marginatis, subrotundatis. Prosternum postice, inter coxas rotundatas, carinulis duabus postrorsum divergentibus, acetabulis clausis. Mesosterno processu intercoxali oblongo, parallelo. Metasternum sulco mediano, linea mediana sterniti ventrali primi aequali. Coxae posticae transversae. Tarsi omnes quinque articulati, articulo quarto tertio fere aequali.

Von allen Cryptophaginen und daher auch von den ihnen zunächst stehenden *Leucohimatinen* durch die kugeligen Vorderhüften, mit hinten deutlich ganz geschlossenen Gelenkgruben verschieden; zu welchem Merkmal vor allen noch die gereiht-punktirten Flügeldecken, die dreigliedrige Fühlerkeule, der gekerbte Halsschildseitenrand, die lappenartig seitlich vorgezogenen Halsschildvorderecken, die queren Hinterhüften und das an Grösse dem dritten fast gleiche vierte Hintertarsenglied kommen, um die Gattung allen bekannten gegenüber zu charakterisieren. Typus der Gattung ist:

Leucohimatiops javanus sp. n.

Elongatus, rufo-testaceus, elytris plus fulvo-testaceis, subtiliter fulvo-pilosis; capite transverso, ut prothorace vix perspicue punctulato; antennis prothoracis basin vix attingentibus, articulo primo subincrassato, crassitudine paulo, secundo tertioque fere sesquin longioribus, quarto quintoque paulo longioribus, 6—8, submoniliformibus; clava articulis quatuor praecedentibus paulo longiore, triarticulata, articulis omnibus transversis, primo secundoque (hoc majore) trapezoidalibus, ultimo transverso; prothorace transverso (9:14), lateribus basin versus subrotundato-convergentibus, angulis anticis lobatoproductis, subexcavatis, posticis obtusangulis; scutello longitudine plus duplo latiore; elytris latitudine plus sesquin longioribus (1:1,7),

lateribus maxima latitudine prope ante medium, punctis seriatis, in triente apicali evanescentibus, spatiis subcoriariis, seria submarginali impressa, sulcum submarginalem formante; femoribus posticis sternito secundo abdominali haud superantibus, tibiis apicem versus sensim incrassatis.

Long. 2,4, lat. 0,7 mm.

Java, typi in Museo Dresden et Berlin-Dahlem.

Leucohimatium elongatum Er., an das die vorliegende neue Art erinnert, unterscheidet sich von ihr auf den ersten Blick durch die parallelseitigen Decken und die weissliche Behaarung, sowie durch die gleichmässig dunklere Färbung, die bei *L. javanus* auf den Decken heller, auf Kopf und Halsschild etwas dunkler rötlich gelbbraun, während die Behaarung goldgelb ist. Die Vorderecken des queren, vorn gerade abgestutzten Halsschildes treten verrundet-zahnartig vor, überragen aber seitlich die hinter ihnen liegende grösste Halsschildbreite nicht. Die Decken sind an den Seiten leicht gerundet, an der Wurzel etwas breiter als die Halsschildwurzel, Punktreihen ziemlich, namentlich an der Wurzel kräftig, im Spitzendrittel aber erloschen, dafür ist aber in diesem ein Nahtstreifen vorhanden, Zwischenräume undeutlich lederartig runzelig, der scharfkantige Seitenrand ist von oben hinter den verrundeten Schulterecken deutlich sichtbar, verjüngt sich aber von da aus nach hinten.

Ich verdanke die Kenntnis dieser Art Herrn Direktor Dr. W. HORN, der sie in Anzahl aus Java von Herrn Dr. RICH. MENZEL (Thee-Proefstation in Buitenzorg) erhielt. Die Art ist wiederholentlich in Tee-Sendungen gefunden worden.
