

FAUNA BURUANA.

COLEOPTERA, Subfam. Cetoninae.

Von

I. MOSER,

Ellrich.

Ischiopsopha gestroi V. D. POLL.

Not. Leyden Mus. VIII. 1886, p. 184. Nach HELLER Abh. Mus. Dresden VIII. 1899, nr. 4, p. 3 ist die auf Buru vorkommende Art *gestroi* V. D. POLL. Der Autor selbst war über den Fundort seiner Art in Ungewissheit.

Stat. 4: 29—31. I. 22. 9 Ex.; Stat. 5: IV. 21. 1 Ex.; Stat. 6. ? 21. 4 Ex.; Stat. 8. : II. 22. 9 Ex.; Stat. 9. : 2. VII. 21. 7 Ex.; Stat. 12. : 4.—7. II. 22. 16 Ex.; Stat. 13. : 28. II.—3. III. 22. 4 Ex.; Mt. Efrarat 1300 m. 13. III. 22. 4 Ex.; Stat. 23. : 24.—25. I. 21. 1 Ex.

10 Ex. in meiner Sammlung; 45 im Museum „Natura Artis Magistra“ in Amsterdam.

Macronota regia F. subsp. *apelles* THOMS.

Mus. scient. 1860, p. 36. Diese Form wurde von Batchian beschrieben. Sie unterscheidet sich von der Stammform, abgesehen von der Färbung, durch ein viel dichter punktiertes Halsschild. Sie ist der Form *fraterna* WESTW., die von BOETTCHER in grosser Anzahl auf den Philippinen gesammelt wurde, sehr ähnlich, unterscheidet sich jedoch durch die Form des Halsschildes. Bei *apelles* divergieren die Halsschildseiten, wenn auch nur sehr schwach, von den Hinterecken bis zur Mitte, bei *fraterna* sind dieselben in der hinteren Hälfte des Halsschildes völlig parallel. Auch *venerea* THOMS. von Celebes ist, wie man aus der Forcepsbildung ersieht, nur eine Lokalform von *regia* F.

Stat. 1. : II.—XII. 21. 54 Ex.; Stat. 2. : IV. 21. 1 Ex.; Stat. 3. : 17.—23. III. 21. 1 Ex.; Stat. 4. : 29.—31. I. 22. 5 Ex.; Stat. 5. : IV. 21. 6 Ex.; VI. 21. 3 Ex.; Stat. 6. : 29. III.—10. IV. 21. 1 Ex.; Stat. 8. : 25.—26. IV. 21. 1 Ex.; Stat. 9. : 26. IV.—1. II. 21. 2 Ex.; 1.—19. VII. 21. 1 Ex.; 21. II. 22. 1. Ex.; Stat. 13. : 28. II.—3. III. 22. 1. Ex.

5 Ex. in meiner Sammlung; 72 im Museum N. A. M.

Poecilopharis whitei THOMS.

Mus. scient. 1860, p. 36. Die vorliegenden Exemplare sind mehr oder weniger stark kupferglänzend und fast ungefleckt. Nur zwei Exemplare

zeigen -auf den Flügeldecken Spuren gelber Flecke. WALLACE hat Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. p. 562 eine Form *buruensis* aufgestellt, die entweder dunkelgrün oder bronzeschwarz mit purpurnen metallischen Reflexen sein soll. Die vorliegenden Exemplare gehören wohl dieser Lokalform an.

Stat. 4.: 29.—31. II. 22. 1 Ex.; Stat. 5.: 21. IV. 21. 900 m. 1 Ex.; Stat. 13.: 28. II.—3. III. 22. 1 Ex., VI. 21. 1 Ex., 28. VIII.—4. IX. 21. 1 Ex.
3 Ex. in meiner Sammlung; 2 Ex. im Museum N. A. M.

Dilochrosis flammula BLANCH.

Voy. Pôle Sud. Ins. 1853, p. 132. t. 9. f. 4. Das eine der beiden vorliegenden Exemplare ist normal gefärbt wie die Art abgebildet ist. Bei dem anderen Exemplare sind die roten Flecke der Flügeldecken stark vergrößert, der Halsschild ist breit rot gerandet und auf dem Kopfe befindet sich ein roter mittlerer Längsfleck.

Stat. 5.: 22. IV. 21. 1 Ex.; Stat. 7.: 2—3. II. 21. 1 Ex.
1 Ex. in meiner Sammlung; 1 im Museum N. A. M.

Protactia taciturna GUÉR.

Voy. Coquille, Ent. II. 1830, p. 91. t. 3. f. 12.

Stat. 1.: II—X. 21. 21. Ex., I—III. 22. 2 Ex.; Stat. 5.: IV. 21. 5 Ex., VI. 21. 5 Ex.; Stat. 6.: III.—IV. 21. 12 Ex.; Stat. 7.: IX. 21. 6 Ex.; Stat. 8.: 25—26. IV. 21. 4 Ex., II. 22. 3 Ex.; Stat. 9.: IV.—VII. 21. 18 Ex.; Stat. 10.: 17.—18. V. 21. 1 Ex.; Stat. 12.: 4.—7. II. 22. 1 Ex.; Stat. 13.: 28. II.—3. III. 22. 1 Ex., 28. VIII.—4. IX. 21. 16 Ex.; Stat. 16.: 29. VIII. 21. 5 Ex., 20. X. 21. 1 Ex.; Stat. 17.: 22.—23. X. 21. 11 Ex.; Stat. 18.: 1—3. XI. 21. 2 Ex.

20 Exemplare in meiner Sammlung; 94 im Museum N. A. M.

Protactia buruensis MUS.

Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 577.

Stat. 1.: II.—X. 21. 65 Ex., I.—III. 22. 7 Ex.; Stat. 3.: 17.—23. III. 21. 1 Ex.; Stat. 14.: 18. IX—2. X. 21. 3 Ex.; Wai Eno—Wai Temun, 700—1000 m. 1 Ex.

20 Exemplare in meiner Sammlung; 61 im Museum N. A. M.

Glycyphana lateralis WALL.

Proc. Ent. Soc. Lond. 1867, p. xcv. Die Art ist von Ceram beschrieben. Die vorliegenden Exemplare haben auf dem Diskus der Flügeldecken einige gelbliche Flecke, stimmen aber sonst mit der von WALLACE gegebenen Beschreibung überein.

Stat. 13.: 28. II—3. III. 22. 1 Ex.; Stat. 14.: 18. IX.—2. X. 21. 2 Ex.; Stat. 16.: 20.—21. X. 21. 1 Ex.

1 Ex. in meiner Sammlung; 3 im Museum N. A. M.

Glycyphana trivittula WALL.

Proc. Ent. Soc. Lond. 1867. p. xcv.

Stat. 1.: IV. 21. 1 Ex.; IX.—X. 21. 2 Ex.; Stat. 4: 15. IV. 21. 1 Ex.; Stat. 8.: II. 22. 1 Ex.; Stat. 9.: 10. V.—1. VI. 21. 1 Ex.; Stat. 13.: 29. II.—3. III. 22. 1 Ex., VIII. 21. 1 Ex.

2 Ex. in meiner Sammlung; 6 im Museum N. A. M.

Glycyphana toxopei nov. spec.

♂. *G. modestae* FAB. simillima. Supra viridis, opaca, subtus olivacea, nitida, pedibus plus minusve brunneis. Capite nigrescente, sat fortiter punctato, inter oculos leviter rugoso et albido-setoso; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice fere parallelis, antice incurvatis, angulis posticis rotundatis, angulis anticis, plerumque etiam margine laterali in dimidia parte anteriore, albido-tomentosis, dorso mediocriter dense punctato, albo-bipunctato; scutello laevi, immaculato; elytris seriato-punctatis, singulis albo-7-punctatis; pygidio plus minusve rufescente, dense aciculato, erecte setoso, flavido-cincto. Subtus medio parce, juxta latera densius punctata, pectoris abdominisque lateribus flavido-tomentosis, processu mesosternali dilatato, margine antico truncato, post apicem setoso; pedibus remote setosis, tibiis anticis acute bidentatis. Long. 9—10 mm.

♀. A mare differt: pygidio corporeque infra nigrescentibus, pygidio plerumque immaculato, interdum maculis duabus flavidis ornato.

Die Art ist der *G. modesta* FAB. von Java sehr ähnlich, oberseits in gleicher Weise weiss gefleckt. Während bei *modesta* das Pygidium am Vorderrande mit einer in der Mitte unterbrochenen, mehr oder weniger breiten gelblichen Tomentbinde versehen ist, ist das Pygidium des ♂ bei dieser Art ringsum breit gelb gesäumt. Diese Randbinde ist meist mehr oder weniger unterbrochen, so dass das Pygidium zuweilen mit 6 getrennten Flecken geziert ist. Beim ♀ sind das Pygidium und die Unterseite schwärzlich, die Seiten des Abdomens sind ungefleckt oder jedes Bauchsegment ist seitlich mit einem kleinen Tomentfleck versehen. Das Pygidium ist gewöhnlich gleichfalls ungefleckt, doch finden sich zuweilen zwei kleine Flecke am Vorderrande.

Stat. 1.: 10. II. — 16. III. 21. 1 Ex., IV. — IX. 21. 2 Ex., I. — III. 22. 1 Ex.; Stat. 4.: 27. — 28. V. 21. 5 Ex.; Stat. 5.: IV. 21. 5 Ex., VI. 21. 12 Ex.; Stat. 8.: 25. — 26. IV. 21. 1 Ex.; Stat. 9.: 26. IV. — 19. VII. 21. 8 Ex.; Stat. 13.: VIII. 21. 1 Ex. — Sehr häufig auf Rosen.

15 Ex. in meiner Sammlung; 21 im Museum N. A. M.