

DESCRIPTION D'UN NOUVEL AGATHIDIUM DES ILES DE LA SONDE

par

M. G. PORTEVIN

(Paris).

Le nombre des *Liodidae* jusqu'ici connus des Iles de la Sonde est extrêmement restreint. Voici la description d'un *Agathidium* de Java, venant des collections du Musée de Buitenzorg et déposé au Musée de Leyden. L'exemplaire m'a été communiqué par Mr. le Dr. WALTHER HORN.

A. (*Cyphocele*) *insulare* nov. sp.

Nigrum, nitidum, omnino impunctatum, antennis ad basin rubris, clava lata, omnino brunnea, articulo ultimo obtuso. Pronotum postice angustissime rufo-marginatum, lateribus cum margine basali haud angulatim conjunctis. Elytra laevia, stria suturali nulla. Subtus brunneum, epipleuris rufis, pedibus rubris. Long. 1 mm 9.

De la taille de *C. laticorne* PORT., de Java, mais bien distinct par sa coloration, sa massue antennaire entièrement sombre, et surtout par la forme du pronotum, dont les marges latérale et basale forment une courbe continue, tandis que, chez *C. laticorne*, elle se réunissent à angle obtus.

1 exemplaire. Java: Tjibodas, 1400 m. d'altitude.

La description de cette espèce porte à 6 le nombre des *Agathidium* décrits de la région indo-malaise, il est remarquable que 5 d'entre eux appartiennent au sousgenre *Cyphocele*, et sont entièrement dépourvus de strie suturale. Le tableau synoptique suivant permettra de les distinguer:

- 1 (10) Tempes non renflées derrière les yeux. Epaules en longue courbe plate (*Cyphocele* THOMS.)
- 2 (3) Bord latéral du pronotum, vu de côté, formant avec la base une courbe continue. Long. 1 mm 9. Java *insulare* PORT.
- 3 (2) Bord latéral du pronotum réuni à la base suivant un angle plus ou moins accentué.
- 4 (5) Angle latéral du pronotum très marqué, presque droit. Taille plus grande, antennes à massue allongée, dont le dernier article est long, pointu et rougeâtre. Birmanie, Sumatra . . . *grouvellei* PORT.
- 5 (4) Angle latéral du pronotum obtus. Taille plus petite, antennes à massue courte et dernier article obtus.
- 6 (7) Taille très petite. Corps noir, bords latéraux du pronotum largement rougeâtres; angle latéral très obtus; dernier article des antennes rougeâtre. Long. 1 mm 5. Sikkim. *harmandi* PORT.

- 7 (6) Taille plus grande. Corps plus ou moins roussâtre; angle latéral du pronotum bien marqué.
- 8 (9) Corps roux; massue moins large, entièrement obscure. Long. 2 mm. Inde Centrale. *andrewesi* PORT.
- 9 (8) Corps brun; massue large à dernier article jaune. Long. 1 mm 9. Java *laticorne* PORT.
- 10 (1) Tempes renflées derrière les yeux . . (s. g. *Saccoceble* GOZ). Entièrement roux brun, avec les pattes, les antennes et les angles postérieurs du pronotum plus clairs; élytres fortement atténués en ogive, avec une strie suturale abrégée en avant. Long. 2 mm 4. Kachmir *laevipenne* PORT.

On voit qu' *insulare* se distingue des autres espèces indo-malaises par le bord latéral du pronotum en courbe continue avec la base. Ce caractère le rapproche de *A. laevigatum* ER., d'Europe, mais celui-ci est plus grand, avec une massue antennaire moins large, dont le dernier article est rouge; il n'y a pas de confusion possible.