

MANTIDEN AUS DEM MUSEUM ZOOLOGICUM BOGORIENSE
(Orthoptera)

von

MAX BEIER

(Naturhistorisches Museum, Wien)

[The following short account is based on a miscellaneous collection of Mantids in the Bogor Museum which had not so far been identified. These specimens were submitted for identification to Dr. M. BEIER, who kindly named and returned them.

The insects collected in S. E. Borneo and in the Moluccas (Halmahera, Atjan, and Obi) were all taken by Mr. A. M. R. WEGNER and his assistants, those from the Papuan Region (island Misool and W. New Guinea) by Dr. M. A. LIEFTINCK. The remaining few specimens are from various other sources.—*Eds.*]

Metoxypilus weneri BEIER, 1 ♂, Ins. Halmahera, Akilamo, 9.12.IX. 1951.

—Das Exemplar ist etwas grösser als die Type von den Kei-Inseln: Pronotum L. 3,2 mm, Elytren L. 16 mm.

Morphoscelis borneana G. Tos, 2 ♂, S. O. Borneo, S. Mentawir, 3.10.1950, und S. Wain, 3.11.1950.

Heopompula ocularis (SAUSS.), 1 ♂, S. O. Borneo, S. Mentawir, 3.10.1950.

Heopompa tosta STÅL, 1 ♂, Sumatra, 6.1.1953.

Heopompa ophthalmica (OL.), Ins. Halmahera, Mt. Siu, 600-700 m und Mt. Sembilan, 600 m, 27.IX.-6.X.1951.

Orthodera burmeisteri W.-MAS., 1 ♀, N. W. Neu-Guinea, Sorong, 5.VI.-7.VII.1948; 1 ♂, Ins. Misool, 8.IX.-20.X.1948.

Orthodera timorensis WERNER, 1 ♂, Ins. Timor, Pasangrahan-See, 12.7.1949.

Lapalopeza nitens (SAUSS.), 1 ♂, 3 ♀, Borneo, Main und Tabang am Bengen River, 8.IX., 12.X. und 29.X.1956.

Miromantis mirandula (WESTW.), 13 ♂, S. O. Borneo, Mentawir, Moan und S. Wain, 1.X.-3.XI.1950.

Xanthomantis (Pliacanthopus) mantispoides (HEB.), 5 ♂, S. O. Borneo, S. Mentawir, 2.-10.X.1950.—Die Art wurde aus N. Borneo beschrieben.

Tropidomantis tenera (STÅL), 13 ♂, 2 ♀, S. O. Borneo, S. Mentawir, Moan und S. Wain, 1.X.-11.XI.1950.

- Fulciniola snelleni** (SAUSS.), 5 ♂, Ins. Obi, Telaga und Laiwui, 30.VII., 3.IX. und 12.X.1953; Ins. Misool, 8.-20.X.1948.—Möglicherweise mit der nur im weiblichen Geschlecht bekannten *Profulcinia varipennis* WESTW. synonym, die dann die Priorität hätte.
- Fulcinia alaris** (SAUSS.), 1 ♀, Ins. Misool, 8.IX.-20.X.1948. — Die Körpermasse des bisher noch unbeschriebenen Weibchens betragen: Körper L. 30 mm, Pronotum L. 9 mm, B. 4 mm, Metazone L. 6 mm, Elytren 4,5 mm. Die Elytren haben einen dunklen Apikalfleck und überkreuzen sich mit der Spitze.
- Stenomantis novae-guineae** (HAAN), 1 ♂, 1 Larve, N. W. Neu-Guinea, 8.VII.-14.VIII. und 24.-31.X.1948.
- Amantis reticulata** (HAAN), 2 ♂, 3 ♀, Sumatra, Masang, 19.I.1953; W. Java, Mt. Gedé, 1000 m, Jänner 1935; S. O. Borneo, S. Mentawir, 8. und 23.X.1950.
- Amantis malayana** (WESTW.), 20 ♂, 2 ♀, Ins. Batjan, Wajaúa, 19.VI.-13.VII.1953; Ins. Obi, Telaga, Laiwui und Lake, 9.VIII.-8.XI.1953; Ins. Halmahera, Toléwang, 12.-25.X.1951; Salawaku river, 16.VI.1953.
- Myrcinus tuberosus** STÅL, 1 ♀ Larve, Central O. Borneo, Tabang, Bengen River, 7.X.1956.
- Leptomantis sumatrana** G.-TOS, 3 ♂, S. O. Borneo, S. Mentawir, 1.-4.X.1950.
- Leptomantis albella** (BURM.), 1 ♀, W. Java, Slopes Mt. Gedé, 1000 m, Jänner 1935.
- Leptomantis fragilis** (WESTW.), 4 ♂, S. O. Borneo, S. Mentawir und S. Wain, Oktober 1950.
- Haania confusa** (SAUSS.), 1 ♀, Central O. Borneo, Tabang, Bengen River, 125 m, 7.X.1956.
- Euchomenella heteroptera** (HAAN), 3 ♂, 1 Larve, O. Borneo, Tabang, Bengen River, 30.VIII. und 8.IX.1956; Gunungsari, 19.VIII.1956.
- Deroplatys desiccata** WESTW., 1 ♂, S. Borneo, Sampit, Jänner 1950.
- Deroplatys lobata** (GUÉR.), 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ Larve, S. O. Borneo, S. Mentawir und Moan, 7.X. und 12.XI.1950. W. Java: Djampang Tengah, 1800, '22.XII.1939.
- Deroplatys truncata** (GUÉR.), 1 ♀ Larve, Borneo, S. Wain, 9.XI.1950.
- Statilia maculata** (THUNB.), 1 ♂, 2 ♀, Borneo: Mentawir, Tabang, Bengen River, Kembang Djangut, 20.IX.-7.X.1956.
- Tenodera aridifolia** (STOLL), 3 ♀, Ins. Halmahera, Toléwang, 12.-25.X.1951. W. Java: Udjung Kulon, 28.VII.1955.
- Tenodera fasciata** (OL.), 4 ♂, Borneo, S. Wain, 1.XI.1950.

- Tenodera fasciata blanchardi** G.-TOS, 16 ♂, 17 ♀, 2 Larven, O. Borneo, Ins. Obi, Ins. Batjan, Ins. Halmahera, Ins. Misool, Juni bis November 1951-1956.
- Tenodera costalis** (BLANCH.), 2 ♂ 2 ♀, N. W. Neu-Guinea, Sorong, 5.VI.-31.X.1948.
- Hierodula venosa** (OL.), 6 ♂, 5 ♀, W. Java, Central- und O. Borneo.
- Hierodula obiensis** HEB., 1 ♂, Ins. Halmahera, Toléwang, 12.-25.X.1951. Bisher nur von der Insel Obi bekannt gewesen.
- Hierodula kapaurana** (G.-TOS), 1 ♀, N. W. Neu-Guinea, Klamono Oilfields, 18.-24.VIII.1948.
- Hierodula dyaka** WESTW., 1 ♂, W. Java, Tjigeunteur, Udjung Kulon, 16.VII.1955.—Neu für Java.
- Hierodula schultzei** (G.-TOS), 1 ♀, N. W. Neu-Guinea, Sorong, 5.VI.-7.VII.1948.
- Hierodula sorongana** (G.-TOS), 1 ♂, N. W. Neu-Guinea, Sorong, 28.VIII.-6.IX.1948.
- Hierodula (Rhombodera) titania** STÅL, 3 ♂, Ins. Halmahera, Toléwang und Mumar River, 25.IX.-25.X.1951; Ins. Batjan, Wajaúa, 16.VII.1953.
- Hierodula (Rhombodera) andaina** (G.-TOS), 1 ♀, N. W. Neu-Guinea, Sorong, 8.VII.-14.VIII.1948; 1 Larve, ebenda, 15.VIII.-27.VIII.1948.
- Hierodula (Rhombodera) rollei** BEIER, 1 ♀, Ins. Obi, Telaga, 4.IX.1953.
- Camelomantis sondaica** (WERNER), 1 ♂, W. Java, Slopes Mt. Gedé, 1000 m, Jänner 1953.
- Psychomantis borneensis** (HAAN), 2 ♂, Moan und S. Waisi, 4.-11.XI.1950.
- Acromantis oligoneura** (HAAN), 5 ♂, W. Java, Tjigeunteur und Udjung Kulon, 9.-14.VII.1955 und 15.7.1956.
- Acromantis australis** SAUSS., 10 ♂, 4 ♀, Ins. Halmahera, Biaur und Toléwang, 7.-25.X.1951, Goa Plains, 20.9.1951; Ins. Batjan, Wajaúa, 12.VII.1953; Ins. Obi, Telaga, 1.8.1953; N. W. Neu-Guinea, Sorong 8.VII.-14.VIII.1948.
- Acromantis moultoni** G.-TOS, 2 ♂, 2 ♀, S. O. Borneo, S. Mentawir, 3.-8.X.1950.
- Catestiasula nitida** (BRUNNER), 2 ♂, 1 ♀, S. O. Borneo, S. Mentawir und Sampit, 3.X.1950; Sumatra, Kasang, 6.1.1953.
- Theopropus cattulus** (WESTW.), 2 ♂, W. Java, Slopes Mt. Gedé, 1000 m, Jänner 1935, und Djampang Tengah, 1500 m, 15.VII.1941.—Diese Art wird oft mit *Th. elegans* (WESTW.) verwechselt.
- Parablepharis kuhlii** (HAAN), 1 ♂, W. Java, Sukabumi, 2000' 19.VI.1941.